

TIL DEG SOM SKAL OPERERES OG STÅR PÅ BLODFORTYNNENDE MEDISINER:

Det er viktig at du tar kontakt med fastlegen din og forteller at du skal opereres. **Dersom fastlegen din mener det er medisinsk forsvarlig** ønsker vi at du slutter med blodfortynnende medisiner noen dager før operasjonen.

Marevanbrukere: Se neste side.

Følgende medisiner bør du slutte med **10 dager før** operasjonen:

Albyl-E

Acetylsalisylsyre

Aspirin

Dispril

Globoid

Asasantin retard / Diprasorin

Persantin og Persantin retard / Aponova

Ticlid

Følgende medisiner bør du slutte med **7 dager før** operasjonen (vi anbefaler å rådføre med behandlende indremedisiner først):

Klopidogrel (Plavix), Prasugrel (Efient) og Brilique

Følgende medisiner bør du slutte med **dagen før** operasjonen:

Pradaxa, Xarelto og Eliquis.

Dersom du får beskjed av legen din om at du ikke kan slutte med disse medisinene, eller bruker andre typer blodfortynnende, ring øyepoliklinikken på 35 900 781.

Kilder:

<http://www.ema.europa.eu>

Felleskatalogen

Marevan og blodplatehemmere ved kirurgi. Utgave nr. 2.2010: Frank Brosstad m.fl.

NH 01.11.18

TIL DEG SOM SKAL OPERERES OG STÅR PÅ MAREVAN

Marevan er en blodfortynnende medisin som skal forhindre blodproppdannelse. Det er en viktig medisin å ta, men det kan som komplikasjon gi økt blødningstendens.

I forbindelse med operasjonen er det viktig at du slutter å ta din vanlige Marevan-dose. Det kan likevel være nødvendig at du får noe blodfortynnende, spesielt hvis du er hjerteoperert/hjerteklaffoperert.

Vi ber deg ta med dette brevet til fastlegen din **FØR** du slutter med Marevan.

TIL LEGEN:

Din pasient, som benytter Marevan®, skal opereres.

Vi anbefaler at Marevan® seponeres **3 dager** før inngrepet.

Du bes vurdere om din pasient bør få lavmolekylært heparin (Klexane® 40 mg s.c. eller Fragmin® 5000 E s.c) som tromboseprofylakse.

Vi ber i såfall vennligst om hjelp til å organisere dette.

Med vennlig hilsen
Øyeavdelingen
Betanien Hospital, Skien